

HOKO EX

LARVICIDA DE USO GANADERO

HOKO EX es un insecticida larvicida con eficacia comprobada contra gran variedad de moscas. Se trata de un granulado soluble en agua, especialmente indicado para luchar contra las larvas de las moscas domésticas, moscas de los establos y demás larvas que se desarrollan en el estiércol, el purín y los restos de forraje de las instalaciones de ganado bovino, ovino, porcino, aviar y en establos.

El componente activo es la ciromazina, que es un regulador de crecimiento de insectos que pertenece al grupo de los derivados de la triazina y interfiere con el metabolismo de la quitina del insecto. Las larvas tratadas no mudarán al estadio siguiente y así el ciclo de la mosca será interrumpido. Las larvas de primer estadio son mucho más susceptibles a la ciromazina que las de segundo y tercer estadios. El efecto sobre la población adulta de moscas se hace visible aproximadamente 2 semanas después de la primera aplicación.



Composición

Ciromazina 2%

Modo de empleo

El producto se aplica en los lugares donde crecen las larvas de mosca tales como los establos para bovinos con suelo emparrillado, en porquerizas con suelo total o parcialmente emparrillado, en gallineros con foso de deyecciones y en general cualquier ambiente ganadero y establos. Usualmente, de dos a cuatro tratamientos al año son suficientes para conseguir tener a la población de moscas bajo control.

Para un control completo de la mosca, se aconseja el uso simultáneo de un insecticida adulticida.

HOKO EX puede ser esparcido en seco, vertido o rociado con regadera o con pulverizador. Antes de ser aplicado como spray o en forma de riego, el producto ha de diluirse en agua. Puede aplicarse en presencia de animales siempre que se evite el contacto directo con estos durante el tratamiento (no rociar los animales, los abrevaderos ni los comederos).

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo, 28760 Tres Cantos (Madrid) | Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es

Dosis

La dosis es de 25g de HOKO EX por m² = 2,5kg por cada 100m² = 25kg por cada 1000m²

El producto debe ser aplicado según el grado de humedad de las deyecciones:

- **Esparcido en seco:** en caso de deyecciones húmedas directamente esparcido en granulo sobre superficie a razón de 25g de producto por cada m²
- **Con pulverizador:** para tratar otras superficies o directamente sobre estiércol solidificado. Aplicar 25g por cada m² de superficie en un volumen de 1-4 litros de agua.
- **Con regadera:** para tratar otras superficies o directamente sobre estiércol solidificado. Aplicar 25g por cada m² de superficie en un volumen de 4-10 litros de agua.

El tratamiento puede repetirse cada 6 semanas o cuando el espesor haya aumentado más de 10cm.

Ejemplos de tratamiento

1. Establos bobinos

En establos para bovinos y cuadras, tratar una franja de unos 50cm a lo largo de los muros, debajo y al lado de las instalaciones con una regadera o un pulverizador. En caso de estiércol líquido, los gránulos de HOKO EX deben esparcirse directamente. El primer tratamiento deberá realizarse de 1 a 3 días después de retirarse el estiércol. En establos de bovinos con suelo emparrillado, esparcir uniformemente los gránulos por toda la superficie.

2. Granjas porcinas

En porquerizas con el suelo totalmente emparrillado, esparcir uniformemente los gránulos por toda la superficie. En caso de suelo parcialmente emparrillado, el tratamiento se limita a las superficies cubiertas por el emparrillado, así como a las zonas periféricas de las gamellas y de las áreas de reposo. El primer tratamiento debe realizarse preferiblemente, antes de guardar o estabular a los los animales y después de retirar el estiércol o purín.

3. Granjas avícolas

En gallineros con fosos de deyecciones secas, esparcir directamente los gránulos si el purín es líquido o húmedo. En gallineros con deyecciones secas es necesario tratar por riego o pulverización toda la superficie. El primer tratamiento deberá realizarse aproximadamente una semana

Registro

R.O.P.Z. Nº: 03035-P (USO GANADERO)

Presentación

Cubo de 5kg

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.



PESTNET ESPAÑA S.L.,

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo, 28760 Tres Cantos (Madrid) | Tel. 918 046 164

www.pestnet-europe.es